


熱中症対応マニュアル



チェック1

1. 熱中症の症状
めまい・顔のほてり・立ちくらみ
筋肉のけいれん・硬直
体のだるさ・頭痛・吐き気・嘔吐
汗のかきかたがおかしい・高体温
失神・筋肉痛・
意識障害・呼びかけに反応しない
手足の運動障害・まっすぐ歩けない
水分補給ができない

対応 1

119番をダイヤルする。

「火事ですか、救急ですか」「救急車をお願いします。」

「場所は」「江戸川区立東小松川小学校です。」

「住所は」「江戸川区東小松川3-27-1です。」

「電話番号は」「03-3652-7413です。」

「状況は」 「小学〇年生、男子、状況は 」

対応2

- ## 1. 応急処置

- ## ①涼しい場所

- ## ②服を緩める

③体を冷やす
※意識がない時は無理に水を飲ませてはいけない。

運動に関する指針

気温(参考)	WGBT 湿度	熱中症予防運動指針	
35°C以上	31°C以上	運動は原則中止	WBT G T31°C以上では、特別の場合以外は運動を中止する。特に子供の場合は中止すべき。
31~35°C	28~31°C	厳重警戒 (激しい運動は中止)	WGBT28°C以上では、熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。運動する場合には頻繁に休息をとり、水分・塩分の補給を行う。体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動中止。
28~31°C	25~28°C	警戒 (積極的に休息)	WGBT25°C以上では、熱中症の危険が増すので、積極的に休息をとり、適宜水分・塩分を補給する。激しい運動では、30分おきくらいに休息をとる。
24~28°C	21~25°C	注意 (積極的に水分補給)	WGBT21°C以上では、熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。
24°C未満	21°C未満	ほぼ安全 (適宜水分補給)	WGBT21°C未満では、通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。市民マラソンなどでは、この条件でも熱中症が発生するので注意。

(公財) 日本体育協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2013) より